



## Kundeinformation om Botulinum Toxin (Azzalure, Vistabel, Dysport)

### Produktet og anvendelse

Botulinum toxin har været anvendt i over 40 år til medicinsk behandling af fx spastiske lammelser, tics og svedtendens. Sidenhen fandt man ud af, at det også havde udglattende effekt på mimiske rynker. Mimiske rynker er fx den såkaldte bekymringsrynke, vandrette linier i panden og rynker omkring øjnene. Det anvendes også til at reducere den store kæbemuskel (masseter) for at give ansigtet et smallere udtryk.

Botulinum toxin virker ved at hæmme de impulser fra nerverne, der får musklen til at trække sig sammen. Man bevarer normal følelse i huden.

### Holdbarhed

Holdbarheden af en behandling varierer typisk mellem 3-6 måneder. Mange vil opnå længere effekt ved kontinuerlige behandlinger.

Vi tilbyder en kontrol/touch up efter 2-3 uger for at sikre, at der er fuld effekt.

### Behandlingen

Behandlingen foregår ved at man med en meget tynd nål injicerer små mængder botulinum toxin ind i området, som man ønsker behandlet. Virkningen indtræder 1-10 dage efter.

### Efter behandlingen

Efter behandlingen kan der være lidt rødme og nogle små buler i det behandlede område. De forsvinder indenfor den første halve time. Der er desuden en lille risiko for blå mærker.

Det er vigtigt, at der ikke masseres på det behandlede område i de første 4-6 timer for at undgå spredning af produktet til de omkringliggende muskler. Vi anbefaler ligeledes, at man ikke dyrker hård motion det første døgn efter behandlingen.

### Kontraindikationer/forsigtighedsregler:

Du kan ikke behandles hvis

- Du er gravid eller ammende
- Du lider af myastenia gravis, Eaton Lambert Syndrom eller andre muskelsygdomme.
- Du har infektion (aktiv akne, herpes eller anden betændelsestilstand) i det område du ønsker behandlet.
- Du har permanente fillers eller implantater i området.
- Du er allergisk overfor et af indholdstofferne i produkterne.

### Risici

Behandling med botulinum toxin er generelt en sikker og effektiv behandlingsmetode. Der kan forekomme bivirkninger, oftest inden for de første dage efter indsprøjtning, og de er sjældent langvarige (under et par uger).

Bivirkninger er sjældne (under 1 %), men kan omfatte følgende

- Hævelse eller blåt mærke på indstiksstedet
- Lettere kvalme
- Midlertidig sænkning af øjenbryn eller øjenlåg
- Forbigående hovedpine
- Forbigående synsforstyrrelser eller øjentørhed



Oplever man synke-, talebesvær eller problemer med vejrtrækningen efter behandlingen, skal man omgående søge hjælp.

Der er ikke rapporteret senfølger eller langtidskomplikationer efter behandling med botulinum toxin.

Der ses i meget sjældne tilfælde en form for resistens overfor botulinum toxin, hvorfor behandlingen i de tilfælde ikke vil have nogen effekt.

## **Samtykke**

Med din underskrift herunder bekræfter du, at:

Du er blevet informeret både skriftligt og mundtligt om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse med behandling med botulinumtoksin A.

Du har haft mulighed for at stille spørgsmål, og for at medbringe en bisidder ved din konsultation.

Du har fået tilfredsstillende svar på mine spørgsmål.

Du har haft 2 døgn betænkningstid mellem konsultation og første behandling.

Du har svaret ærligt på spørgsmålene om din medicinske historie.

## **Du giver samtykke til at blive behandlet.**

Dato:

Navn:

Underskrift: